

105 年 8 月份杭菊最新藥劑延伸簡訊

文／茶作技術課 林秀榮
(電話：03-4822059 轉 226)

依據中華民國 105 年 8 月 1 日防檢三字第 1051488727A 號函，杭菊新公告延伸使用藥劑整理如下：

杭菊炭疽病：新增 24.9% 待克利乳劑、24.9% 待克利水懸劑、250g/L (25%W/V) 待克利乳劑、10% 待克利可濕性粒劑、75% 四氯異苯腈可濕性粉劑、75% 四氯異苯腈可濕性粒劑、40% 四氯異苯腈水懸劑及 23.6% 百克敏乳劑等 8 種。

杭菊薊馬類：新增 40% 納乃得水溶性粉劑、40% 納乃得水溶性粒劑、40% 納乃得水溶性粉劑（水溶性袋裝）及 25% 納乃得水溶性粉劑等 4 種。

公告藥劑種類及使用方法如下表一至二所示，敬請各位農友注意藥劑使用，若有任何問題請洽茶改場及各分場與工作站植物保護同仁。

表一、杭菊炭疽病延伸使用藥劑種類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
24.9% 待克利乳劑	0.08-0.3 公升	3,000	發病初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	採收前 21 天停止施藥。
24.9% 待克利水懸劑	0.08-0.3 公升	3,000	發病初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	採收前 21 天停止施藥。
250g/L (25%W/V) 待克利乳劑	0.08-0.3 公升	3,000	發病初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	採收前 21 天停止施藥。
10% 待克利可濕性粒劑	0.2-0.8 公斤	1,200	發病初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	採收前 21 天停止施藥。
75% 四氯異苯腈可濕性粉劑 (chlorothalonil)	0.4-1.7 公斤	600	發病初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	採收前 14 天停止施藥。
75% 四氯異苯腈可濕性粒劑 (chlorothalonil)	0.4-1.7 公斤	600	發病初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	採收前 14 天停止施藥。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
40% 四氯異苯腈水懸劑 (chlorothalonil)	0.8-3.1 公升	320	發病初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	採收前 14 天停止施藥。
23.6% 百克敏乳劑	0.08-0.5 公升	3,000	發病初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	採收前 21 天停止施藥。

表二、杭菊薊馬類延伸使用藥劑種類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
40% 納乃得水溶性粉劑	0.2-0.6 公斤	1,600	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	採收前 21 天停止施藥。
40% 納乃得水溶性粒劑	0.2-0.6 公斤	1,600	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	採收前 21 天停止施藥。
40% 納乃得水溶性粉劑(水溶性袋裝)	0.2-0.6 公斤	1,600	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	採收前 21 天停止施藥。
25% 納乃得水溶性粉劑	0.3-1.0 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	採收前 21 天停止施藥。