



第
86
期

發行人：陳國任
主編：林金池、賴正南
發行所：行政院農業委員會茶業改良場
地址：326 桃園市楊梅區埔心中興路 324 號
電話：03-4822059 傳真：03-4824790
印刷：台灣身心障礙人福利促進協會
電話：02-2222-8571

中華民國一〇五年八月二十日出版

國內郵資已付

中壢郵局

許可證

中壢字第 138 號

雜誌

不容忽視的茶樹潛在性害蟲（二） - 棕長頸捲葉象鼻蟲

文圖／茶作技術課 林秀榮*、曾信光
（*電話 03-4822059 轉 226）



棕長頸捲葉象鼻蟲（圖二）普遍分布於平地至低海拔山區，原為森林害蟲，危害植物範圍包括朴樹、山桂花、臺灣山香圓、水金京、九節木、紅楠等多種植物，由於山林地區進行茶園開墾，造成該害蟲原本的食物缺乏，繼而危害茶樹幼嫩之葉片，葉片

圖一、棕長頸捲葉象鼻蟲危害茶葉片病徵
上具有明顯食痕，甚至會啃食穿孔（圖一）。

棕長頸捲葉象鼻蟲成蟲遇到驚動會有假死現象掉落地面，習性機警。雌蟲產卵後會切下葉片，並將之捲起築巢成圓筒狀形，將產下的卵粒包裹於巢之中間（圖二），掛在樹上像搖籃，故又稱搖籃蟲，卵孵化後之幼蟲即在其中取食危害。

此害蟲目前對茶樹尚無造成顯著經濟損失，但由於其卵及幼蟲對於環境變化（如高溫、寒冷等）較具耐受性，為茶園潛在性害蟲種類，供農友田間管理時需多注意之害蟲種類。



圖二、棕長頸捲葉象鼻蟲正切葉片並築巢產卵，右圖為該蟲之完成捲葉築巢圓筒狀外觀。