

茶與杭菊最新藥劑延伸簡訊

文／茶作技術課 林秀棠
(電話：03-4822059 轉 226)

依據中華民國 104 年 12 月 24 日防檢三字第 1041489341A 號函，新公告延伸使用藥劑之作物範圍包括菊花與山茶科作物，整理如下：

杭菊薊馬類：新增 2.5% 賜諾殺水懸劑、11.6% 賜諾殺水懸劑及 80% 賜諾殺可濕性粉劑等三種。

山茶科作物葉蟬類：新增 18.3% 芬殺蟬水懸劑、10% 芬殺蟬乳劑、15% 芬殺蟬水懸劑等三種。

山茶科作物赤葉枯病：新增 23.6% 百克敏乳劑一種。

公告藥劑種類及使用方法如表一至二所示，敬請各位農友注意藥劑使用，若有任何問題請洽茶改場及各分場與工作站植物保護同仁。

目前油茶用藥請參考山茶科核准登記使用種類，本次山茶科藥劑延伸種類可使用於油茶病蟲害防治上。

表一、菊花薊馬類延伸藥劑

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
2.5% 賜諾殺水懸劑 (spinosad)	0.6-2.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	食用花卉採收前 14 天停止施藥。
11.6% 賜諾殺水懸劑 (spinosad)	0.1-0.6 公升	4,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	食用花卉採收前 14 天停止施藥。
80% 賜諾殺可濕性粉劑 (spinosad)	0.02-0.08 公斤	32,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	食用花卉採收前 14 天停止施藥。

表二、山茶科作物葉蟬類延伸藥劑

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
18.3% 芬殺蟬水懸劑 (fenazaquin)	0.33 公升	3,000	害蟬發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	茶葉採收前14天、採籽前21天停止施藥。
10% 芬殺蟬乳劑 (fenazaquin)	0.5 公升	2,000	害蟬發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	茶葉採收前14天、採籽前21天停止施藥。
15% 芬殺蟬水懸劑 (fenazaquin)	0.4 公升	2,500	害蟬發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	茶葉採收前14天、採籽前21天停止施藥。

